

Eine Abfolge von Blockuniversen

Harald Rieder

30. Juli 2023

Inhaltsverzeichnis

Motivation	1
Grundlagen	3
Orts-, Impuls-, Zeit- und Energieoperatoren	3
Die Bornsche Regel	4
Die Zeit in der Quantenmechanik	6
Zerlegung in H- und E-Raum	6
Zeitentwicklung	7
Eine Abfolge von Blockuniversen	8
Gerichtete Zeit	11
Und der Quanten-Zeno-Effekt?	11
Im Dekohärenzbild	13
Beobachterabhängige Verschränkung	15
Beispiele	16
Freie Lösung	16
Harmonischer Oszillator	16
Zusammenfassung	17
Anhang	17
Beispiel Schrödingergleichung mit Potential	17
Beispiel freie Dirac-Gleichung	19

Motivation

Das Messproblem der Quantenmechanik entsteht aus der Vorstellung einer stetigen Entwicklung von mathematischen Größen in der als absolut angesehen gemeinsamen Zeit in Verbindung mit der Erfahrung, dass Kenntnis über das durch die mathematischen Größen beschrie-

bene Quantending¹ nur dann erlangt werden kann, wenn sich dabei dessen Zustand un stetig ändert. Dadurch sind zu jedem Zeitpunkt 2 verschiedene sich daran anschließende Arten von Zukünften möglich und niemand kann sagen, wann oder warum die eine oder die andere gewählt wird.

Dieses Paradoxon hat schon die besten Köpfe herausgefordert und der ein oder andere dachte sich, eine Lösung zu haben. Mitunter taucht die Denke auf, dass verschiedene Sichten auf die Quantenmechanik möglich seien, so genannte „Interpretationen der Quantenmechanik“, die am Ende doch nur eine Frage des Geschmacks seien. Wir werden hier diesen Weg nicht gehen. Statt dessen soll das Paradoxon dadurch aufgelöst werden, dass zu jedem Zeitpunkt nur eine Art von Zukunft möglich ist. Anstatt an der Vorstellung eines Zeitparameters, von dem Geschehen stetig abhängt, festzuhalten, werfen wir diese Vorstellung komplett über Bord. Es gibt einige gute Gründe, es auf diese Art zu versuchen:

1. Unterhalb der Planck-Zeit kann es keine stetige Zeitentwicklung mehr geben.
2. Eine Propagation des Geschehens durch lineare Operatoren, wie sie für die sich stetig anschließende Zukunft im Modell geschieht, treibt das Weltgeschehen eben *linear* weiter. Man kann schwerlich glauben, dass dadurch irgend etwas wie Lebendigkeit erfolgreich modelliert werden kann. Aus der klassischen Chaos-Theorie haben wir gelernt, dass erst eine nichtlineare Dynamik zu etwas führt, dass uns an Leben erinnert. Die un stetig sich anschließende Zukunft liefert uns so eine nichtlineare Dynamik.
3. Um Kenntnis über ein Quantending zu erlangen ist ein Verlassen der stetigen Entwicklung irgendwo² auf dem langen Weg in das Bewusstsein notwendig. Die Dekohärenztheorie kann erklären, wie Information aus einem Quantending in seine Umgebung fließt unter der Annahme einer gemeinsamen stetigen Entwicklung. Doch wenn Kenntnis über Quantending (und seine Umgebung) erlangt werden soll, ist ein un stetiger Schritt notwendig. Das *problem of outcomes* wird durch die Dekoränztheorie nicht gelöst, und das ist das eigentliche Paradoxon.
4. Eine komplett neue Dynamik könnte erfunden werden. Das erscheint aber schwieriger, als einfach die Hälfte der Dynamik wegzuwerfen.

Die Quantenmechanik liefert uns statistische Größen: Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse. Wir haben gelernt, wie man Empfindungen mit den Ereignissen zu verknüpfen hat, die das mathematische Modell hergibt. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese Theorie Häufigkeiten und Mittelwerte teilweise erschreckend genau liefern kann. Wenn die Hälfte der Dynamik über Bord geworfen werden soll, dann müssen dennoch die statistischen Aussagen der Theorie im experimentell gesteckten Rahmen erhalten bleiben. Ob dies überhaupt möglich ist, soll hier untersucht werden.

Die un stetige Dynamik hat die Eigenart, dass das Geschehen zum Erliegen kommt, wenn man immer nach derselben Information fragt. In technischer Ausdrucksweise führt die Anwendung eines projektiven Messoperators zum „Kollaps“ des Zustandsvektors auf einen Eigenraum des Messoperators. Danach führt die Wiederholung der projektiven Messung zu keinem Verlas-

¹Bewusst vermeiden wir den Begriff „Quantensystem“. Ein System besteht aus primär existierenden Teilen, die sekundär miteinander wechselwirken. Das ist eine Vorstellung, die der Quantenwelt nicht gerecht wird. Die Teilung eines Hilbertraums in Unterräume ist immer irgendwo willkürlich.

²an einem sogenannten Heisenberg-Schnitt

sen des Eigenraums mehr. Um ein Geschehen mit der un stetigen Dynamik für einen Beobachter scheinbar am Laufen zu halten, muss es Prozessschritte geben, die ständig neue Überlagerungen herstellen.

Während in gewöhnlicher Quantentheorie mit der Beobachtung üblicherweise Schluss ist, denn dann können die subjektiven Empfindungen gegen die Zahlen des mathematischen Modells verglichen werden, fordern wir ständige Beobachtungen, damit ein Geschehen überhaupt stattfinden kann. Da das menschliche Subjekt aber nur mit der Seite der projektiven Messungen in Verbindung steht, ist ihm die andere verborgen. Natürlich wäre es ontologisch das Einfachste anzunehmen, dass die anderen Prozessschritte genauso wie die einen stattfinden, dass sie am Ende mit Empfindungen in Zusammenhang stehen, nur eben für andere Subjekte.

Grundlagen

Orts-, Impuls-, Zeit- und Energieoperatoren

Weil wir ihnen später begegnen werden, rufen wir uns die Matrixelemente spezieller Operatoren und die Komponenten ihrer Eigenvektoren in speziellen Vektorbasen in Erinnerung. Wir unterscheiden nicht zwischen abzählbaren und kontinuierlichen Dirac-Vektoren und verwenden durchgängig die Indexschreibweise, d.h. $\{\psi_{x_j}\} \equiv \psi(x)$: aus unendlich vielen durch x_j indizierten Vektorkomponenten entsteht im Grenzfall deren unendlicher Dichtheit eine Funktion einer kontinuierlichen Variable x .

Zur Notation: Im Kontinuum stellt die Variable x einen kontinuierlichen Index dar. In Integralen treten Terme wie dx auf, wir haben dort also $\int dx$. Dem entspricht im Diskreten eine Summe \sum_{x_j} . Gewöhnlich wird in der Literatur nur der Index j hingeschrieben, also \sum_j und aus dem jeweiligen Zusammenhang geht hervor, welche Basis der Index j indiziert. Zwecks größerer Klarheit werden wir Vektorkomponenten meist mit x_j usw. indizieren.

Die Matrixelemente des Ortsoperator \hat{x} und die Komponenten seiner Eigenvektoren $|x_j\rangle$ zu den Eigenwerten x_j sind in der Ortsbasis $\{|x_j\rangle\}$

$$\langle x_j | \hat{x} x_k \rangle = x_{x_j x_k} = \delta_{x_j x_k} x_j \quad \langle x_k | x_j \rangle = \psi_{x_j x_k} = \delta_{x_j x_k} \quad (1)$$

und in der Impulsbasis³ $\{|p_j\rangle\}$

$$\langle p_j | \hat{x} p_k \rangle = x_{p_j p_k} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_j} \delta_{p_j p_k} \quad \langle p_k | x_j \rangle = \psi_{x_j p_k} = C e^{-\frac{i}{\hbar} x_j p_k} \quad (2)$$

$\delta_{x_j x_k}$ soll im Kontinuum dem $\delta(x_j - x_k)$ entsprechen. C ist eine Normierungskonstante⁴

Wolfgang Pauli schrieb in *Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik*: „Wir schließen also, daß auf die Einführung eines Operators \hat{t} grundsätzlich verzichtet und die Zeit t in der Wellenmechanik notwendig als gewöhnliche Zahl betrachtet werden muß.“ Dies mag für die

³Da wir weiter unten einen Zeitimpuls einführen, müssten wir hier eigentlich genauer von einem Ortsimpuls sprechen.

⁴Im Allgemeinen ist $|C| = (2\pi\hbar)^{-N}$ zu fordern, wenn N die Anzahl der Integrationsvariablen im Skalarprodukt ist.

nicht-relativistische Quantenmechanik praktikabel gewesen sein. Relativistische Theorien legen jedoch die Gleichbehandlung von Raum und Zeit nahe, und dies wollen wir hier auch tun.

Die Matrixelemente des Zeitoperators \hat{t} und die Komponenten seiner Eigenvektoren $|t_j\rangle$ zu den Eigenwerten t_j sind in der Zeitbasis $\{|t_j\rangle\}$

$$\langle t_j | \hat{t} t_k \rangle = t_{t_j t_k} = \delta_{t_j t_k} t_j \quad \langle t_k | t_j \rangle = \psi_{t_j t_k} = \delta_{t_j t_k} \quad (3)$$

und in der (Zeit-)Impuls- oder Energiebasis $\{|E_j\rangle\}$

$$\langle E_j | \hat{t} E_k \rangle = t_{E_j E_k} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial E_j} \delta_{E_j E_k} \quad \langle E_k | t_j \rangle = \psi_{t_j E_k} = C e^{\frac{i}{\hbar} t_j E_k} \quad (4)$$

Eine Begründung für die unterschiedlichen Vorzeichen in (2) und (4) findet sich im Anhang.

Die Bornsche Regel

In der ursprünglichen (1926) Formulierung besagte die Bornsche Regel, dass

- bei einer Messung einer Observable einer der Eigenwerte $\{\lambda_j\}$ des zugehörigen Messoperators \hat{L} beobachtet wird.
- die Wahrscheinlichkeit für die Messung des Eigenwerts λ_j sich aus dem Absolutquadrat des Skalarprodukts zwischen Anfangszustand $|\psi^{(0)}\rangle$ und Eigenvektor $|\lambda_j\rangle$ bestimmt.

Nach der Messung liegt der Eigenzustand $|\psi^{(1)}\rangle = |\lambda_j\rangle$ vor und bei wiederholter Messung von \hat{L} ändert sich daran nichts mehr.

Offen bleiben musste zunächst, was genau eigentlich eine Messung ist. Das Messexperiment wurde in der Sprache der klassischen Physik beschrieben. Man hatte ein paar mechanische Größen wie Ort und Impuls, die sich in die Sprache der Quantenmechanik übertragen ließen. Irgendwo musste es einen Übergang zwischen Quantenmechanik und klassischer Physik geben, doch wo und wie war unklar.

An dieser Lage haben sich ein paar Dinge in 100 Jahren geändert:

- In den Gleichungen der Quantentheorien gibt es Größen, die kein klassisches Analogon haben, z.B. den Spin.
- Die meisten Physiker dürften daran glauben, dass die Natur vollständig quantenmechanisch zu beschreiben ist, und dass die klassische Physik irgendwie daraus abzuleiten ist.
- Mit der Dekohärenztheorie ist es mit quantenmechanischen Mitteln gelungen, mehr von dem zu beschreiben, was bei einer Messung geschieht.

Heute sollten wir uns die Messung vorstellen als einen Prozess, der ein zu beobachtendes Quantending zunächst quantendynamisch an die Umgebung koppelt. Dabei entsteht bei einer idealen Messung ein Zustand, der einerseits immer noch eine Überlagerung mit den ursprünglichen Amplituden $\psi_{\lambda_j}^{(0)}$ bezogen auf die Messbasis $\{|\lambda_j\rangle\}$ darstellt, andererseits die

Messbasis maximal verschränkt mit einer entsprechenden Umgebungsbasis $\{|e_j\rangle\}$. Die Verschränkung soll nach der Dekohärenztheorie mittels eines in der Zeit stetigen deterministischen Prozesses $\hat{U}(t - t_0)$ erfolgen.

$$|e^{(0)}\rangle \otimes |\psi^{(0)}\rangle = |e^{(0)}\rangle \otimes \sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} |\lambda_j\rangle \xrightarrow{\hat{U}(t_1 - t_0)} \sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} (|e_j\rangle \otimes |\lambda_j\rangle) \quad (5)$$

Dadurch ist Information über $|\psi^{(0)}\rangle$ in der Umgebung verfügbar geworden und kann abgefragt werden. Dieser finale Abfrageschritt ist Stand heute nicht verstanden. Es ist aber gewiss, dass der Endzustand in (5) im Allgemeinen nicht bewusst erfahren werden kann, sondern nur Zustände nach bestimmten finalen Schritten, zum Beispiel Projektionen auf die Ortsbasis⁵. Eventuell ist es auch nur der Abfrageschritt selbst, der bewusst erfahren wird. Der Abfrageschritt ist verbunden mit einem Kollaps der Überlagerung in einen der Endzustände mit der Bornschen Wahrscheinlichkeit.

$$\sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} (|e_j\rangle \otimes |\lambda_j\rangle) \xrightarrow{p_j^{(0) \rightarrow (1)} = |\psi_{\lambda_j}^{(0)}|^2} |e_j\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \quad (6)$$

$|\psi_{\lambda_j}^{(0)}|^2$ ist die Übergangswahrscheinlichkeit

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = |\langle \lambda_j | \psi^{(0)} \rangle|^2 = |\langle \psi^{(1)} | \psi^{(0)} \rangle|^2 \quad (7)$$

in der ursprünglichen Formulierung der Bornschen Regel.

Ob nun (5) tatsächlich stattfindet, ist von einem pragmatischen Standpunkt aus gesehen unerheblich⁶, so lange sich der Dekohärenzprozess der Beobachtbarkeit aufgrund fehlender technologischer Fähigkeiten entzieht. Beobachtete Ereignisse mit ihren zugehörigen Wahrscheinlichkeiten sind am Ende dieselben. Doch seit einigen Jahren sind Dekohärenzprozesse technologisch greifbar geworden, z.B. in einem Experiment von Sonnentag und Hasselbach aus dem Jahr 2006.

Nimmt man an, dass erstens der Beobachter Information nicht direkt aus dem Quantenteil abgreifen kann, sondern nur indirekt über dessen Umgebung, und zweitens die Quantentheorie am Ende der gesamten klassischen Physik zugrunde liegen muss, dann drängt sich ein Prozess (5) aus logischen Gründen geradezu auf. Die theoretische Idee reicht in das Jahr 1970 zurück.

Ein Beispiel für $\hat{U}(t_1 - t_0)$

Ein zur Vorbereitung einer Messung geeigneter Operator \hat{U} in (5) ist

$$\hat{U}(t - t_0) = \exp\left(-\frac{i(t - t_0)}{\hbar} f(\hat{\lambda}) \otimes {}^E \hat{H}\right) \quad (8)$$

mit einer einheitenlosen operatorwertigen Funktion f und einem hermiteschen Operator ${}^E \hat{H}$, der nur auf die Umgebung E wirkt. λ_j sind die Eigenwerte von $\hat{\lambda}$. Angewendet auf den Zustand

⁵Dies steht im Zusammenhang mit der Frage, warum noch keine Schrödinger-Katzen beobachtet wurden.

⁶„shut up and calculate“

von (5) ergibt sich

$$\begin{aligned} \hat{U}(t - t_0) \left(\sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} |\lambda_j\rangle \otimes |e^{(0)}\rangle \right) &= \sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} |\lambda_j\rangle \otimes \exp \left(-\frac{i(t - t_0)}{\hbar} f(\lambda_j)^E \hat{H} \right) |e^{(0)}\rangle \\ &\equiv \sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} |\lambda_j\rangle \otimes |e_j(t - t_0)\rangle \end{aligned} \quad (9)$$

wodurch \hat{U} das Quantending mit der Umgebung verschränkt⁷ hat unter Beibehaltung der Amplituden $\psi^{(0)}$ und damit der Bornschen Wahrscheinlichkeiten von (6).

Die Zeit in der Quantenmechanik

Zerlegung in H- und E-Raum

Gleichungen der Quantenmechanik sind vom Prinzip her eigentlich einfach. Ein linearer Operator \hat{O} wird angewendet auf einen Zustandsvektor $|\psi\rangle$ und das Ergebnis soll 0 ergeben.

$$\hat{O} |\psi\rangle = 0$$

Beim Blick auf Schrödinger-, Dirac- und Klein-Gordon-Gleichungen fällt eine Gemeinsamkeit in's Auge. Der Operator \hat{O} wirkt immer in einem Produktraum $\mathcal{H} \otimes \mathcal{E}$. Er hat die Gestalt

$$\hat{O} = \mathcal{H} \hat{H} \otimes \mathcal{E} \hat{1} - \mathcal{H} \hat{1} \otimes \mathcal{E} \hat{E}$$

und ist damit die Summe aus einem Operator \hat{H} , der nur im Teilraum \mathcal{H} wirkt und einem Operator \hat{E} , der nur im Teilraum \mathcal{E} wirkt. Der Teilraum \mathcal{E} ist der Zeitunterraum und eine wählbare Basis ist die der Zeiteigenvektoren $|t_j\rangle$. Der Teilraum \mathcal{H} enthält alles andere.

Durch die Zerlegung bietet sich ein Produktansatz zur Lösung dieser Gleichungen an. Mit

$$|\psi\rangle = \mathcal{H} |\psi\rangle \otimes \mathcal{E} |\psi\rangle$$

bekommen wir

$$\hat{H} \mathcal{H} |\psi\rangle \otimes \mathcal{E} |\psi\rangle - \mathcal{H} |\psi\rangle \otimes \hat{E} \mathcal{E} |\psi\rangle = 0 \quad (10)$$

und die Gleichung zerfällt in 2 Eigenwertgleichungen für die Operatoren \hat{H} und \hat{E} .

$$\begin{aligned} \hat{H} \mathcal{H} |\psi\rangle &= E \mathcal{H} |\psi\rangle \\ \hat{E} \mathcal{E} |\psi\rangle &= E \mathcal{E} |\psi\rangle \end{aligned} \quad (11)$$

Dieses Gleichungssystem ist noch gekoppelt über die Eigenwerte E .

Aufgrund der Linearität von \hat{H} und \hat{E} sind alle Linearkombinationen von Produkten zum selben Eigenwert E ebenfalls Lösungen. Die allgemeine Lösung

$$|\psi\rangle = \sum_j \psi_j \mathcal{H} |E_j\rangle \otimes \mathcal{E} |E_j\rangle \quad (12)$$

⁷Die Exponentialfunktion verschränkt auf diese Weise: $\exp(\hat{a} \otimes \hat{b}) = \sum \frac{1}{n!} \hat{a}^n \otimes \hat{b}^n$

mit mehr als einem Summand steht für eine (natürlich subjektive) Verschränkung der Teilräume \mathcal{H} und \mathcal{E} . Die Darstellung (12) von $|\psi\rangle$ ist eine Schmidt-Zerlegung.

Die unverschränkten Lösungen ${}^{\mathcal{H}}|E_j\rangle \otimes {}^{\mathcal{E}}|E_j\rangle$ werden üblicherweise als *stationäre Zustände* oder *Energieeigenzustände* bezeichnet. Denn der Differentialoperator $i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$, der in den Gleichungen auftritt, muss aufgefasst werden als Matrixelemente $E(t - t')$ des kontinuierlichen Energieoperators \hat{E} in der Zeitdarstellung. Nähme man es genauer, müsste man immer noch die Delta-Distribution dazuschreiben:

$$E(t - t') = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \delta(t - t')$$

Der gesamte Produktraum $\mathcal{H} \otimes \mathcal{E}$ kann aus den allgemeinen Produkten der Eigenvektoren von \hat{H} und \hat{E} aufgespannt werden:

$$|\psi\rangle = \sum_{jk} \psi_{jk} {}^{\mathcal{H}}|E_j\rangle \otimes {}^{\mathcal{E}}|E_k\rangle \quad (13)$$

Doch alle Zustände, die Terme mit $j \neq k$ haben, sollen „in der Natur nicht vorkommen“. Etwas geringer könnte man auch fordern, dass sie durch die uns zur Verfügung stehenden Messprozesse nicht beobachtbar sind.

Die Bornschen Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Lösungen sind

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \sum_{jk} \psi_j^{(1)*} \psi_k^{(1)} \psi_j^{(0)} \psi_k^{(0)*} \quad (14)$$

Die Bornschen Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen allgemeinen Zuständen, also auch den nicht beobachtbaren, sind

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \sum_{jklm} \psi_{jk}^{(1)*} \psi_{lm}^{(1)} \psi_{jk}^{(0)} \psi_{lm}^{(0)*} \quad (15)$$

Zeitentwicklung

Oft wird die Zeitentwicklung durch einen parametrisch von der Zeitdifferenz $t_1 - t_0$ abhängigen Zeitentwicklungsoperator ausgedrückt. Für die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Ausgangszustand $|\psi^{(0)}\rangle$ zur Zeit t_0 zu einem Endzustand $|\psi^{(1)}\rangle$ zur Zeit t_1 gilt bei einem nicht explizit zeitabhängigen Operator \hat{H}

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \left| \langle \psi^{(1)} | \hat{U}(t_1 - t_0) | \psi^{(0)} \rangle \right|^2 \quad (16)$$

Dazu muss bemerkt werden:

- Ein zeitabhängiger Hamiltonoperator modelliert üblicherweise einen zeitabhängigen Einfluss der Umgebung. Betrachten wir das All als Quantenwelt, dann gibt es davon keine Umgebung. Dort stünde ein zeitabhängiger Operator \hat{H} für zeitabhängige Naturgesetze. Diese Möglichkeit mag es geben, wir betrachten sie hier aber nicht.

- Was genau sich in (16) zeitlich entwickelt, ist ontologisch nicht klar. So lange die Wahrscheinlichkeit sich dabei nicht ändert, kann die Zeitentwicklung beliebig zwischen Operator und Vektoren hin- und hergeschoben werden, was in den gebräuchlichen „Bildern“, also Schrödinger-, Heisenberg- und Wechselwirkungsbild, ausgenutzt wird.
- $|\psi^{(0)}\rangle$ und $|\psi^{(1)}\rangle$ sind Vektoren aus dem \mathcal{H} Unterraum. Statt abstrakter Vektoren aus dem \mathcal{E} Unterraum treten in der Formel nur Zeiteigenwerte t_0, t_1 als Parameter auf. Auch in der relativistischen Quantenmechanik wird das invariante Skalarprodukt definiert als dreidimensionales Integral proportional zu $\int \frac{d^3\vec{p}}{p_0} \psi^*(p) \phi(p)$. Diese Integration „auf der Massenschale“ entspricht der Vermeidung der Zustände (13), bei denen $j \neq k$ ist. p_0 gehört zwar zum \mathcal{E} Raum, ist aber in dieser Formel nicht unabhängig sondern eine Funktion von \vec{p} aus dem \mathcal{H} Raum. Diese Ungleichbehandlungen wirken verstörend, wenn man sie mit der zugrunde liegenden symmetrischen Aufgabenstellung (11) vergleicht.
- Es handelt sich bei (16) um die ursprüngliche Formulierung (7) der Bornschen Wahrscheinlichkeit. Der Verschränkungsprozess mit der Umgebung ist nicht ausmodelliert.

In der Energiebasis des \mathcal{H} Raumes ist \hat{U} bei einem nicht explizit zeitabhängigen Hamilton-Operator diagonal. Die Matrixelemente in der Energiebasis sind

$$U_{E_j E_k} = \delta_{E_j E_k} e^{-\frac{i}{\hbar} E_j (t_1 - t_0)} = \delta_{E_j E_k} (e^{\frac{i}{\hbar} E_j t_1})^* e^{\frac{i}{\hbar} E_j t_0} \quad (17)$$

In Komponenten stellt sich (16) dann so dar:

$$p^{(0) \rightarrow (1)} = \left| \sum_j (\mathcal{H} \psi_{E_j}^{(1)} e^{\frac{i}{\hbar} E_j t_1})^* \mathcal{H} \psi_{E_j}^{(0)} e^{\frac{i}{\hbar} E_j t_0} \right|^2 \quad (18)$$

In den Exponentialfunktionen erkennen wir die Komponenten von Zeiteigenvektoren in der Energiedarstellung aus (4) wieder. Wir haben es also eigentlich mit Skalarprodukten von Vektoren aus dem $\mathcal{H} \otimes \mathcal{E}$ Raum zu tun

$$|\psi^{(0)}\rangle = \sum_j \mathcal{H} \psi_{E_j}^{(0)} \mathcal{H} |E_j\rangle \otimes \mathcal{E} \psi_{t_0 E_j} \mathcal{E} |E_j\rangle = \sum_j \mathcal{H} \langle E_j | \psi_{E_j} \rangle \mathcal{E} \langle E_j | t_0 \rangle \mathcal{H} |E_j\rangle \otimes \mathcal{E} |E_j\rangle$$

$$|\psi^{(1)}\rangle = \sum_j \mathcal{H} \psi_{E_j}^{(1)} \mathcal{H} |E_j\rangle \otimes \mathcal{E} \psi_{t_1 E_j} \mathcal{E} |E_j\rangle = \sum_j \mathcal{H} \langle E_j | \psi_{E_j} \rangle \mathcal{E} \langle E_j | t_1 \rangle \mathcal{H} |E_j\rangle \otimes \mathcal{E} |E_j\rangle$$

also mit Vektoren der Form (12). (16) legt es somit schon nahe, die Abfolge von Ereignissen, die die Quantenmechanik voraussagen will, als projektive Messungen unter Beteiligung einer Projektion auf einen Zeitunterraum anzusehen.

Dies ist auch das, was uns die spezielle Relativitätstheorie nahelegt. Eine Lorentz-Transformation „dreht“ die Grenze zwischen \mathcal{H} und \mathcal{E} Unterräumen. Selbst wenn eine projektive Messung für einen Beobachter auf den \mathcal{H} Raum beschränkt wäre, müsste sie allen zu diesem Beobachter relativ bewegten Beobachter auch als Messung in ihrem \mathcal{E} Eigenzeitraum erscheinen.

Eine Abfolge von Blockuniversen

Wir wollen nun die deterministische Zeitentwicklung durch einen stochastischen Prozess ersetzen. Der Ausgangspunkt dazu ist ein Prozessschritt wie in (6). Das heißt: ein Beobachter nimmt

einen „Kollaps“ wahr, bei dem ein zwischen \mathcal{H} , \mathcal{E} und der Umgebung E verschränkter Zustand entschränkt wird. Dieser Prozessschritt soll sein

$$\sum_{jk} \psi_{jk} |e_{jk}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \otimes |t_k\rangle \xrightarrow{p_{jk} = |\psi_{jk}|^2} |e_{jk}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \otimes |t_k\rangle$$

Es werden also beobachtet der Zustand $|\lambda_j\rangle$ *und gleichzeitig* die Zeit $|t_k\rangle$, *nicht* der Zustand $|\lambda_j\rangle$ zu einer Zeit t . Dadurch ist die Dynamik am Ende angekommen. Jede weitere Beobachtung liefert immer wieder dieselben Eigenwerte und damit auch dieselbe Zeit t_k .

Die Frage stellt sich nun, zu welcher Zeit die Beobachtung der Zeit eigentlich stattfindet. Diese Zeit, in der alles Wahrgenommene beobachtet wird, kann natürlich nicht mehr dieselbe Zeit sein wie die, die sich erst dann preisgibt, wenn sie durch eine bestimmte Entschränkung beobachtet wird. Da wir außer dem Beobachter sonst nichts mehr haben, muss diese außerhalb des physikalischen Modells befindliche Zeit zum Beobachter gehören. Es muss eine psychische Zeit sein.

Für jeden physikalischen Zeitpunkt t_k müssen die Wahrscheinlichkeiten denen von (6) entsprechen. Die $|\psi_{jk}|^2$ müssen also proportional sein zu den $|\psi_{\lambda_j}|^2$, das heißt wir können setzen

$$\psi_{jk} = \psi_{\lambda_j} \psi_{t_k}$$

Die ψ_{t_k} sind frei wählbare komplexe Zahlen, es müssen nur die Normierungsbedingungen

$$\sum_j |\psi_{\lambda_j}|^2 = 1 \quad \sum_k |\psi_{t_k}|^2 = 1$$

erfüllt sein. Damit haben wir

$$\sum_{jk} \psi_{\lambda_j} \psi_{t_k} |e_{jk}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \otimes |t_k\rangle \xrightarrow{p_{jk} = |\psi_{\lambda_j}|^2 \cdot |\psi_{t_k}|^2} |e_{jk}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \otimes |t_k\rangle \quad (19)$$

Den kontinuierlich parametrisierten Operator $\hat{U}(t_1 - t_0)$ nähern wir an durch Potenzen \hat{u}^n eines kleinstmöglichen Zeitentwicklungsoperators \hat{u} . Dabei stellen wir uns $t_1 - t_0$ vor als Vielfaches einer kleinstmöglichen Zeitdifferenz t_p .

$$t_1 - t_0 = nt_p \quad \hat{u} = \hat{U}(t_p) \quad \hat{u}^n = \hat{U}(t_1 - t_0)$$

Der Operator \hat{U} ist dabei der aus (5) und nicht der aus (16). Er wirkt im Produktraum des Quantendings und seiner Umgebung, aber nicht im Unterraum \mathcal{E} , welcher von den Zeiteigenvektoren aufgespannt wird.

Die deterministische Zeitabhängigkeit des Ausgangszustands im konventionellen Schrödingerbild drückt sich aus durch

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t - t_0) |\psi^{(0)}\rangle$$

In unserem neuen Bild transportiert die k-malige Anwendung von \hat{u} vom Ausgangszustand zu jenem, der mit $|t_k\rangle$ verschränkt sein soll.

$$|\psi^{(k)}\rangle = \hat{u}^k |\psi^{(0)}\rangle$$

Damit eine deterministische Zeitentwicklung vorgetäuscht werden kann, muss die Überlagerung auf der linken Seite von (19) damit diese Gestalt annehmen

$$\sum_{jk} \psi_{\lambda_j}^{(0)} \psi_{t_k} \hat{u}^k (|e^{(0)}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle) \otimes |t_k\rangle \rightarrow \quad (20)$$

Diese kollabieren in der Beobachtung zu den Vektoren auf der rechten Seite von (19). Die $|\psi_{\lambda_j}\rangle^2$ haben wir durch (20) so gewählt, dass sie die konventionelle Quantenmechanik wiedergeben, und die ψ_{t_k} sind nach wie vor frei. Damit ein Kollaps stattfinden kann bzw. vor der Beobachtung eine Verschränkung vorliegt, müssen wenigstens 2 der ψ_{t_k} ungleich 0 sein.

Das Analogon zum Beispiel (8) ist nun

$$\hat{u}^k = \exp\left(-\frac{ikt_p}{\hbar} f(\hat{\lambda}) \otimes {}^E \hat{H}\right) \quad (21)$$

Die Wirkung von \hat{u}^k ist analog zu (9)

$$\begin{aligned} \hat{u}^k \left(\sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} |\lambda_j\rangle \otimes |e^{(0)}\rangle \right) &= \sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} |\lambda_j\rangle \otimes \exp\left(-\frac{ik}{\hbar} f(\lambda_j) {}^E \hat{H}\right) |e^{(0)}\rangle \\ &\equiv \sum_j \psi_{\lambda_j}^{(0)} |\lambda_j\rangle \otimes |e_{jk}\rangle \end{aligned} \quad (22)$$

und deswegen kann (20) unter der Annahme eines geeigneten Messoperators \hat{u} gleichwertig geschrieben werden als

$$\sum_{jk} \psi_{\lambda_j}^{(0)} \psi_{t_k} |e_{jk}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \otimes |t_k\rangle \rightarrow \quad (23)$$

Insgesamt werden damit in (20) \mathcal{H} **und** \mathcal{E} Räume des Quantendings mit der Umgebung verschränkt. Die Information ist für den Beobachter abgreifbar über die Vektoren $|e_{jk}\rangle$ der Umgebung, an die er direkt angeschlossen ist. Seine Perspektive teilt die Umgebung wiederum in \mathcal{H} und \mathcal{E} Räume, die ihm im Zustand (23) verschränkt erscheinen. Er schließt durch den Kollaps $\rightarrow |e_{jk}\rangle$ aufgrund seines mathematischen Modells auf die Information $|\lambda_j\rangle$ und $|t_k\rangle$.

Damit sind wir am Ziel angekommen. Allerdings besteht noch die Unschönheit, dass der Prozess nach der ersten Beobachtung zum Erliegen kommt. Wir brauchen einen weiteren Prozessschritt, der wieder eine Überlagerung der Form (20) aufbaut.

Dieser andere Prozessschritt ist für menschliche Beobachter verborgen, da wir postuliert haben, dass der Kollaps der Überlagerung das ist, das erfahren wird.

Dieser andere Prozessschritt darf aus mehreren Unterschritten bestehen und kann aus dem Unterraum der Lösungsvektoren (12) hinausführen. Der Prozess muss nicht markovsch sein und darf ein Gedächtnis haben. All das können wir nicht wissen, wenn es nicht gelingt, weitere Beobachtungsperspektiven zu erschließen.

Gerichtete Zeit

Die stochastischen Prozessschritte (19) werden beobachtet und wechseln sich ab mit nicht beobachtbaren Prozessschritten. Das ergibt insgesamt eine Folge von Beobachtungen, die jeweils einen Zeitpunkt t_k liefern. Der verborgene Prozess könnte theoretisch Überlagerungen erzeugen, die uns ungewohnt abenteuerliche Folgen von Zeitpunkten t_k liefern. Das uns erscheinende Fließen der Zeit im physikalischen Kanal kann dadurch dargestellt werden, dass ausgehend von t_k nur Überlagerungen aus Zeiten $> t_k$ durch den verborgenen Prozess präpariert werden.

$$|e^{(0)}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \otimes |t_k\rangle \xrightarrow{p_n} \sum_{l,m=k+1} \psi_{n,\lambda_l} \psi_{n,t_m} |e_{lm}\rangle \otimes |\lambda_l\rangle \otimes |t_m\rangle \quad (24)$$

Durch p_n haben wir angedeutet, dass der verborgene Prozess mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten in n verschiedene Überlagerungen führen kann, ohne dass der Beobachter Mittel hätte, deren Unterschiedlichkeit festzustellen.

Im einfachsten Fall kann ein Fließen durch sichere ($n = 1$) verborgene Prozessschritte jeweils auf eine Überlagerung aus 2 benachbarten Zeiten so erzeugt werden:

$$|e^{(0)}\rangle \otimes |\lambda_j\rangle \otimes |t_k\rangle \xrightarrow{100\%} \sum_{l,m=k+1}^{m=k+2} \psi_{\lambda_l} \psi_{t_m} |e_{lm}\rangle \otimes |\lambda_l\rangle \otimes |t_m\rangle$$

Ein einfaches Beispiel in einem Hilbertraum aus 2 Qutrits und unistochastischen, markovschen Prozessschritten enthält der Artikel Über psychische und physikalische Zeit.

Hier soll ausdrücklich betont werden, dass die Zeiteigenvektoren $\{|t_k\rangle\}$ des Raums \mathcal{E} zunächst willkürlich nummeriert werden können. Erst durch das Vorhandensein eines entsprechenden Prozesses und eine bestimmte Beobachtungsperspektive wird eine Reihenfolge nahegelegt, die dadurch immer einen subjektiven Charakter hat.

Und der Quanten-Zeno-Effekt?

Natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie der Quanten-Zeno-Effekt in die neue Dynamik passt. In der konventionellen Quantenmechanik soll er ja entstehen durch die Störung der Dynamik (16) durch wiederholte Beobachtung. Nun haben wir aber (16) nicht mehr und statt dessen nur noch einen beobachtbaren Typ von Prozessschritt. (20) liefert uns immer die richtigen, zu den beobachteten Zeitpunkten passenden Amplituden, wodurch wir eigentlich mit dem Quanten-Zeno-Effekt kein Problem haben. Was aber macht den Unterschied zwischen „häufig“ und „selten“ beobachten aus?

(20) liefert Zeiten und stellt damit für den Beobachter eine Uhr dar. Nun will er diese für sein Quanten-Zeno-Experiment mehr oder weniger oft ablesen. Um dieses „mehr oder weniger oft“ physikalisch abzusichern, muss er eine weitere „Laboruhr“ haben, die er oft genug abliest. Diese Laboruhr bringt weitere Räume \mathcal{H} und \mathcal{E} in's Spiel. Der verborgene Prozess muss auch die Laboruhr geeignet präparieren, damit dem Beobachter auch durch sie ein Fluss der physikalischen Zeit erscheint.

Damit haben wir ein Quantending Q , dessen Zeiten wir beobachten

$$Q_{t_1} \rightarrow Q_{t_2} \rightarrow \dots$$

und eine Laboruhr L^8 , die uns ebenfalls Zeiten liefert

$$L_{t_1} \rightarrow L_{t_2} \rightarrow \dots$$

Nun ist klar, was mit „häufig“ und „selten“ gemeint ist. Der Beobachter bekommt von der Laboruhr immer wieder Überlagerungen der Gestalt (20) angeboten und liest daraus die Laborzeiten ab. Für eine Verschränkung des Quantendings mit der Umgebung sorgt er aber nicht bei jeder Ablesung der Laboruhr, sondern mal bei enger, mal bei weiter auseinander liegenden Ablesungen.

Das Quantending liefert ihm eine weitere Zeit. Selbst wenn sie gerichtet ist wie die Zeit der Laboruhr, könnte sie gegenüber dieser noch wilde Sperenzchen treiben. Dies widerspricht jedoch der empirischen Erfahrung, dass sich Uhren gut synchronisieren lassen. Damit sich Uhren synchronisieren lassen, muss der verborgene Prozess Zeiteigenvektoren aller Räume \mathcal{E} geeignet verschränken. Anders ausgedrückt: Unterräume, die vom verborgenen Prozess in bestimmter Weise verschränkt werden, erscheinen uns als objektiv vergehende physikalische Zeit.

Wir tasten uns an die neue Dynamik heran und lassen zunächst die Dekohärenz durch Verschränkung mit der Umgebung außen vor wohl wissend, dass es immer möglich sein muss, einen Dekohärenzprozess zu finden, der uns dieselben Wahrscheinlichkeiten liefert wie die ursprüngliche Sicht. Wie in (7) soll es „jederzeit“ möglich sein, durch eine projektive Messung entweder nur die Laboruhr abzulesen oder zusätzlich noch das Quantending zu messen. Die Überlagerung (20) erweitert um die Laboruhr aber ohne Berücksichtigung der Umgebung soll uns der verborgene Prozess in dieser Form herstellen:

$$\sum_{jkl} \psi_{t_k}^Q \psi_{\lambda_j}^{(0)Q} \hat{u}^k |^Q \lambda_j\rangle \otimes |^Q t_k\rangle \otimes {}^L \hat{u}^k |^L \lambda_l\rangle \otimes |^L t_k\rangle \rightarrow \quad (25)$$

Hierbei haben wir Zeiteigenvektoren mit exakt denselben Indizes paarweise verschränkt. So lange noch nichts anderes gemessen wurde, könnten wir durchaus zulassen, dass z.B. auch Terme mit $|^Q t_k\rangle \otimes |^L t_{k+1}\rangle$ zur Überlagerung beitragen. Dies würde bedeuten, dass Uhren in der Natur nicht exakt synchron laufen können. Wir beschränken uns nun aber auf den einfachen Fall exakter Synchronizität.

Von (25) aus können wir eine vollständige projektive Messung durchführen

$$\xrightarrow{p_{jk}} {}^Q \psi_{\lambda_j}^{(0)Q} \hat{u}^k |^Q \lambda_j\rangle \otimes |^Q t_k\rangle \otimes {}^L \hat{u}^k |^L \lambda_l\rangle \otimes |^L t_k\rangle \quad (26)$$

Von hier aus stellt uns der verborgene Prozess wieder die Überlagerung (25) zusammen. Da wir in der λ -Basis gemessen haben, vereinfacht sich (25) speziell in dieser Basis zu

$$\sum_{kl} {}^Q \hat{u}^k |^Q \lambda_j\rangle \otimes |^Q t_k\rangle \otimes {}^L \hat{u}^k |^L \lambda_l\rangle \otimes |^L t_k\rangle \rightarrow \quad (27)$$

⁸Am Ende ist sie natürlich auch ein Quantending. In der relativistischen Quantenfeldtheorie bringt jedes „Teilchen“ seine eigene Zeitkoordinate mit. Oder anders ausgedrückt vergrößert ein Erzeugungsoperator die Fockraumbelegung um einen $\mathcal{H} \otimes \mathcal{E}$ Raum.

Wollen wir das nächste Mal in einer anderen Basis messen, so erscheint (27) in dieser anderen Basis in der Gestalt (25). Da wir beim Ablesen der Laborzeit die Messbasis immer beibehalten, bleibt es für L dagegen dauerhaft bei der einfacheren Form.

Oder wir können eine teilprojektive Messung durchführen, wenn wir nur die Laborzeit ablesen aber das Quantending in Ruhe lassen

$$\xrightarrow{|\psi_{t_k}|^2} {}^L\hat{u}^k |{}^L\lambda_l\rangle \otimes |{}^Q t_k\rangle \otimes |{}^L t_k\rangle \otimes \sum_j {}^Q\psi_{\lambda_j}^{(0)} {}^Q\hat{u}^k |{}^Q\lambda_j\rangle \quad (28)$$

Von hier aus stellt der verborgene Prozess wieder (25) her, in der nicht-vereinfachten Form, da die Überlagerung in Q noch vorhanden ist.

Damit kann die neue Dynamik die Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse inklusive Ausbremsen durch häufige Beobachtungen liefern, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. Die Summe in (24) muss über mindestens 2 verschiedene Zeiten gehen, da nur eine Überlagerung erfahren werden kann. Selbst wenn dort statt der Summe ein Integral stünde, müsste das Integral über ein endliches Intervall laufen. Der Erwartungswert der physikalischen Zeit kann deswegen nicht gleich der letzten gemessenen Zeit sein. Im Unterschied zur Formulierung des Quanten-Zeno-Effekts mit kontinuierlicher deterministischer Zeitentwicklung ist die Voraussage der neuen Dynamik:

Es ist nicht möglich, die Bewegung komplett anzuhalten. Denn die Beobachtbarkeit setzt eine Veränderung des Zustands seit der letzten Beobachtung voraus. Vielmehr erwarten wir eine Mindestveränderung der physikalischen Zeit mit jeder Beobachtung, die durch die Präparation, die der verborgene Prozess uns anbietet, bestimmt ist⁹.

Im Dekohärenzbild

In der Dekohärenztheorie ergibt sich ein anderes Bild. Es ist nicht so, dass ein Zustand (25) stets die Wahl erlaubt, die Laboruhr abzulesen oder ein Quantending zu messen oder beides. Vielmehr muss die Entscheidung bereits davor gefallen sein. Entweder wird nur die Laboruhr mit der Umgebung verschränkt, dann kann auch nur sie gemessen werden. Oder es wird zusätzlich das Quantending mit der Umgebung verschränkt. Die Entscheidung, worüber im nächsten Schritt Information erlangt werden kann, muss *vor* dem verborgenen Prozess getroffen werden.

Um über die physikalische Zeit informiert zu sein, muss der Experimentator dafür sorgen, dass sich seine Laboruhr L stets mit der Umgebung E verschränkt. Der verborgene Prozess soll ihm solche Überlagerungen anbieten

$$\begin{aligned} & \sum_{jkl} \psi_{t_k} {}^Q\psi_{\lambda_j}^{(0)} {}^{E\otimes L}\hat{u}^k \left(|e^{(0)}\rangle \otimes {}^L|\lambda_l\rangle \right) \otimes {}^Q\hat{u}^k {}^Q|\lambda_j\rangle \otimes {}^Q|t_k\rangle \otimes {}^L|t_k\rangle \rightarrow \\ & \equiv \sum_{jkl} \psi_{t_k} {}^Q\psi_{\lambda_j}^{(0)} |e_{kl}\rangle \otimes {}^L|\lambda_l\rangle \otimes {}^Q\hat{u}^k {}^Q|\lambda_j\rangle \otimes {}^Q|t_k\rangle \otimes {}^L|t_k\rangle \rightarrow \end{aligned} \quad (29)$$

⁹also eine Art Planck-Zeit

Der linke Operator \hat{u} wirkt auf Laboruhr und Umgebung wieder wie ein idealer Messoperator, der rechte auf das Quantending. Insgesamt haben wir einen Operator

$$\hat{u} = {}^E \otimes {}^L \hat{u} \otimes {}^Q \hat{u} \quad (30)$$

Von (29) aus kann er eine physikalische Zeit ablesen

$$\rightarrow |e_{kl}\rangle \otimes {}^L |\lambda_l\rangle \otimes {}^Q |t_k\rangle \otimes {}^L |t_k\rangle \otimes \sum_j {}^Q \psi_{\lambda_j}^{(0)} {}^Q \hat{u}^k {}^Q |\lambda_j\rangle$$

Will der Experimentator dagegen Informationen über das Quantending erhalten, dann muss er es auch mit der Umgebung verschränken. Dazu muss der verborgene Prozess eine andere Überlagerung synthetisieren.

$$\begin{aligned} & \sum_{jkl} \psi_{t_k} {}^Q \psi_{\lambda_j}^{(0)} \hat{u}^k \left(|e^{(0)}\rangle \otimes {}^L |\lambda_l\rangle \otimes {}^Q |\lambda_j\rangle \right) \otimes {}^Q |t_k\rangle \otimes {}^L |t_k\rangle \rightarrow \\ & \equiv \sum_{jkl} \psi_{t_k} {}^Q \psi_{\lambda_j}^{(0)} |e_{jkl}\rangle \otimes {}^L |\lambda_l\rangle \otimes {}^Q |\lambda_j\rangle \otimes {}^Q |t_k\rangle \otimes {}^L |t_k\rangle \rightarrow \end{aligned} \quad (31)$$

wobei wir als Analogon zu (8) diesen Messoperator angenommen haben

$$\hat{u}^k = \exp \left(-\frac{ikt_p}{\hbar} f \left({}^L \hat{\lambda} \right) \otimes g \left({}^Q \hat{\lambda} \right) \otimes {}^E \hat{H} \right)$$

Von hier aus kann er die volle Information erlangen

$$\rightarrow |e_{jkl}\rangle \otimes {}^L |\lambda_l\rangle \otimes {}^Q |\lambda_j\rangle \otimes {}^L |t_k\rangle \otimes {}^Q |t_k\rangle$$

Nun stellt sich natürlich die Frage, warum und aufgrund wovon der verborgene Prozess häufig (29) und seltener (31) präparieren sollte. Dies entspräche einer häufigen Ablesung der Laboruhr mit ab und zu stattfindenden Quantenmessungen. Einen unitären Operator (30), der nur in bestimmten Potenzen¹⁰ k eine Verschränkung des Quantendings mit der Umgebung durchführt, gibt es nicht.

Soll der verborgene Prozess Teil einer objektiven Wirklichkeit sein, so ist die Erwartung eher, dass er von einem bestimmten Ausgangszustand ausgehend immer das Gleiche präpariert, wobei allerdings die ψ_{t_k} frei bleiben können. Und der Experimentator kann der Meinung sein, dass er aufgrund seiner „freien Willensentscheidung“ einen Schalter umlegt und damit entscheidet, ob (29) oder (31) durchgeführt wird, also die „kleine“ oder die „große“ Verschränkung entsteht.

Um dies zu modellieren wird im einfachsten Fall ein weiteres Qubit-Paar benötigt. Zunächst stellen wir fest, dass der Übergang vom Ausgangszustand aus hin zu (29) eine unitäre Operation ist, die wir als \hat{U}_0 bezeichnen wollen.

$$(29) = \hat{U}_0 \left(|e^{(0)}\rangle \otimes {}^L |\lambda_l\rangle \otimes {}^Q |\psi^{(0)}\rangle \otimes {}^Q |t_0\rangle \otimes {}^L |t_0\rangle \right) \quad (32)$$

¹⁰und damit zu bestimmten physikalischen Zeiten

Genauso ist der Übergang vom Ausgangszustand aus hin zu (31) eine unitäre Operation, die wir als \hat{U}_1 bezeichnen wollen.

$$(31) = \hat{U}_1 \left(|e^{(0)}\rangle \otimes^L |\lambda_l\rangle \otimes^Q |\psi^{(0)}\rangle \otimes^Q |t_0\rangle \otimes^L |t_0\rangle \right) \quad (33)$$

Das Qubit-Paar soll aus einem \mathcal{H} -artigen Bit und einem \mathcal{E} -artigen Zeitbit bestehen. ${}^{\mathcal{H}}|0\rangle$ soll dafür stehen, dass eine Messung an Q durchgeführt werden soll. ${}^{\mathcal{H}}|1\rangle$ soll dagegen bedeuten, dass im nächsten Schritt nur die Laborzeit abgelesen werden soll. ${}^{\mathcal{E}}|0\rangle$ und ${}^{\mathcal{E}}|1\rangle$ sind irgendwelche verschiedenen Zustände im Qubit-Zeitraum. Wir definieren uns die Qubit-Produktzustände

$$\begin{aligned} |00\rangle &\equiv {}^{\mathcal{H}}|0\rangle \otimes {}^{\mathcal{E}}|0\rangle & |11\rangle &\equiv {}^{\mathcal{H}}|1\rangle \otimes {}^{\mathcal{E}}|1\rangle \\ |++\rangle &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) & |--\rangle &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle) \end{aligned}$$

$|++\rangle$ und $|--\rangle$ verschränken also \mathcal{H} und \mathcal{E} .

Als nächstes erweitern wir den Ausgangszustand um das Qubit-Paar. Er soll sein

$$|e^{(0)}\rangle \otimes^L |\lambda_l\rangle \otimes^Q |\psi^{(0)}\rangle \otimes^Q |t_0\rangle \otimes^L |t_0\rangle \otimes |00\rangle$$

wenn als nächstes nur die Laborzeit abgelesen werden soll und

$$|e^{(0)}\rangle \otimes^L |\lambda_l\rangle \otimes^Q |\psi^{(0)}\rangle \otimes^Q |t_0\rangle \otimes^L |t_0\rangle \otimes |11\rangle$$

wenn eine vollständige Messung durchgeführt werden soll. Nun können wir leicht einen unitären Operator \hat{U} angeben, der in Abhängigkeit des Ausgangszustands zu (29) oder (31) führt.

$$\hat{U} = \hat{U}_0 \otimes |++\rangle \langle 00| + \hat{U}_1 \otimes |--\rangle \langle 11|$$

Von $|00\rangle$ aus führt uns dieser Operator zu

$$(29) \otimes |++\rangle$$

und von $|11\rangle$ zu

$$(31) \otimes |--\rangle$$

Bei der Beobachtung zerfällt nun die Verschränkung (29) bzw. (31) zugleich mit der Verschränkung des Qubit-Paares und damit fällt die Entscheidung, ob als nächstes nur die Laborzeit abgelesen werden soll oder eine vollständige Messung durchgeführt werden soll.

Beobachterabhängige Verschränkung

Verschränkung ist wie Überlagerung in der Quantenmechanik eine subjektive Eigenschaft. Während die Eigenschaft „ist eine Überlagerung“ von der subjektiven Wahl der Basis abhängt, in der ein Vektor dargestellt wird, hängt die Eigenschaft „ist verschränkt“ von der subjektiven Aufteilung seines Produktraums in Teilräume ab. Dabei gibt es den Zusammenhang, dass mit der Zweiteilung eines Produktraums Schmidt-Basen je Zustand festgelegt werden. Verschränkt ein Zustand die Teilräume, dann ist er in seinen Schmidt-Basen eine Überlagerung. Verschränkt er sie nicht, dann ist er eine keine Überlagerung.

Ein Lorentz-Boost wechselt von der Perspektive eines Beobachters A zur Perspektive eines zu diesem relativ bewegten Beobachters B. In 2 Kontinuums-Dimensionen stellen sich die Matrixelemente des Lorentz-Transformationsoperators $\hat{\Lambda}_\beta$ so dar:

$$\Lambda_\beta(x, t, x', t') = \delta(x' - \gamma(x + \beta t)) \delta(t' - \gamma(t + \beta x)) \quad (34)$$

Angewendet auf die Komponenten $\psi_A(x, t)$ eines Hilbertraum-Vektors bewirkt diese Matrix die Transformation auf die Perspektive von B

$$\Lambda : \psi_A(x, t) \mapsto \psi_B(x, t) = \psi_A(\gamma(x + \beta t), \gamma(t + \beta x)) \quad (35)$$

Dabei ändert sich die subjektive Aufteilung des Gesamtraums in \mathcal{H} und \mathcal{E} Räume.

Wir starten mit einem zwischen \mathcal{H}_A und \mathcal{E}_A eingeschränkten Vektor. Dessen Komponenten $\psi_A(x, t)$ lassen sich als Produkt zweier Funktionen von x und t darstellen.

$$|\psi\rangle = \sum f(x) |x\rangle \otimes \sum g(t) |t\rangle$$

$$\langle x, t | \psi \rangle_A \equiv \psi_A(x, t) = f(x) \cdot g(t)$$

Wenn die Komponenten nicht als Produkt in dieser Form geschrieben werden können, dann ist der Vektor verschränkt.

Beispiele

Freie Lösung

$$e^{i(kx - \omega t)} = e^{ikx} \cdot e^{-i\omega t} \mapsto e^{ik\gamma(x + \beta t)} \cdot e^{-i\omega\gamma(t + \beta x)} = e^{i\gamma(k - \omega\beta)x} \cdot e^{-i\gamma(\omega - k\beta)t}$$

Die freie Lösung ist auch aus Sicht von B eine freie Lösung und eingeschränkt.

Die Überlagerung zweier freier Lösungen

$$C_1 e^{i(k_1 x - \omega_1 t)} + C_2 e^{i(k_2 x - \omega_2 t)}$$

ist aus Sicht von A und B \mathcal{H} - \mathcal{E} verschränkt.

Harmonischer Oszillator

Nach der Beobachtung einer Einschränkung durch A liegt ein Vektor vor mit den Komponenten

$$\psi_n(x, t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) e^{-\frac{1}{2}\frac{m\omega}{\hbar} x^2} \cdot e^{-i\omega t}$$

mit den Hermiteschen Polynomen H_n . Der Term x^2 führt nach der Transformation zum Auftreten eines Terms xt im Exponenten, so dass die Komponenten nicht mehr in ein Produkt der Form $f(x) \cdot g(t)$ zerlegt werden können.

Dies bedeutet nach unserem Postulat, dass wenn das Geschehen durch die Beobachtung durch A für A zum Erliegen gekommen ist, dies für B nicht der Fall ist. Aus Sicht von B kann nun eine Beobachtung erfolgen. Es steht also die Vermutung im Raum, dass zu A relativ bewegte Beobachter an dem ihm verborgenen Prozessschritt beteiligt sind. Umgekehrt kann A an dem Prozessschritt beteiligt sein, der B verborgen ist.

Zusammenfassung

Wir haben die Idee von Hugh Everett aufgegriffen, das Messproblem der Quantenmechanik dadurch zu lösen, dass auf einen Prozessstyp verzichtet wird. Anders als in seinem Vorschlag, der zur Viele-Welten-Interpretation geführt hat, haben wir uns genau anders entschieden und auf die stetige Zeitentwicklung zugunsten einer rein stochastischen Dynamik verzichtet. Dazu haben wir die Bornsche Regel auf einen um den Zeitunterraum erweiterten Hilbertraum angewendet mit der Konsequenz, dass die physikalische Zeit durch die Beobachtung angehalten wird. Wir mussten einen verborgenen Prozessschritt postulieren, der aus Sicht des Beobachters neue Überlagerungen aufbauen kann, um die Dynamik am Laufen zu halten.

Wie es die relativistische Physik nahelegt, werden nun Zeit- und Ortsunterräume gleichwertig behandelt und die Trennung des Gesamtraums in Zeit- und nicht-Zeitunterräume hängt ab von der Perspektive des Beobachters. Sie ist sozusagen eine Eigenschaft des Subjekts, sie ist die Art, wie der Geist an den physikalischen Kanal angeschlossen ist.

Durch die Gleichbehandlung von Zeit und Raum ist die Richtung der physikalischen Zeit und ihr Fließen verlorengegangen. Wir konnten sehen, dass das Anbieten geeigneter Überlagerungen aus Sicht des Beobachters wie ein Fließen der physikalischen Zeit erscheinen kann. Dies ließ erahnen, dass der Eindruck einer fließenden physikalischen Zeit eine Illusion ist, die durch 2 Dinge entsteht: die spezielle Perspektive des Beobachters und die spezielle Präparation durch den verborgenen Prozess. Das Fließen der psychischen Zeit erscheint dem Beobachter dadurch als Anwachsen von Indizes von Vektoren bestimmter Unterräume und damit als fließende physikalische Zeit. Das Modell bietet dabei die Freiheiten an, dass Uhren („Elementarteilchen“) nicht exakt synchronisierbar sein müssen, oder dass die Zeitrichtung wie zufällig wechselt.

Zuletzt haben wir das Thema gestreift, dass Relativbewegung ein Perspektivwechsel ist, der die Verschränkung zwischen Zeit- und nicht-Zeitunterräumen ändert. Dadurch haben wir gesehen, dass relativbewegte Beobachter am für den nicht bewegten Beobachter verborgenen Prozess irgendwie beteiligt sein müssen.

Anhang

Beispiel Schrödingergleichung mit Potential

Die Schrödingergleichung in der gebräuchlichen Form

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t) - i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = 0$$

ist aufzufassen als Gleichung zwischen Matrixelementen und Vektorkomponenten, wobei Summationen¹¹ bereits ausgeführt wurden. Um die Summationen wiederzubekommen muss gewählt werden¹²

$$\langle t | \hat{E} t' \rangle \equiv E_{tt'} = +i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \delta(t - t')$$

¹¹ auch hier synonym für Integrationen gebraucht

¹² Wir gehen gleich von (11) aus, wo \mathcal{H} und \mathcal{E} bereits separiert sind.

denn es ist

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \int dt' \delta(t - t') \psi(x, t') = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t)$$

Alternativ funktioniert auch

$$E_{tt'} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial t'} \delta(t - t')$$

was durch partielle Integration leicht zu zeigen ist.

Für eine hermitesche Matrix $E_{tt'}$ muss gelten $E_{t't}^* = E_{tt'}$. Wenn also Ableitungen der Delta-Distribution zum Aufbau hermitescher Matrizen verwendet werden, dann muss der Koeffizient der 0. Ableitung reell sein, der der 1. Ableitung imaginär, und so weiter.

Analog ist das Matrixelement des Potentials

$$\langle x | \hat{V} | x' \rangle \equiv V_{xx'} = \delta(x - x') V(x)$$

denn es ist

$$V(x) \int dx' \delta(x - x') \psi(x', t) = V(x) \psi(x, t)$$

Gleichwertig ist diesmal

$$V_{xx'} = \delta(x - x') V(x')$$

denn aufgrund der Definition der Delta-Distribution ist

$$\int dx' \delta(x - x') V(x') \psi(x', t) = V(x) \psi(x, t)$$

Wenn der Operator der kinetischen Energie $\frac{\hat{p}^2}{2m}$ sein soll, dann taugen als Matrixelemente des Impulsoperators

$$\langle x | \hat{p} | x' \rangle \equiv p_{xx'} = \pm i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x')$$

denn es ist

$$\begin{aligned} & \frac{(\pm i\hbar)^2}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \int dx' dx'' \delta(x - x') \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x'') \psi(x'', t) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \int dx' \delta(x - x') \frac{\partial}{\partial x'} \psi(x', t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) \end{aligned}$$

Damit der Kommutator $[\hat{x}, \hat{p}]$ zu $+i\hbar \hat{1}$ wird, müssen wir oben das *negative* Vorzeichen wählen und gleichwertig ist dann

$$p_{xx'} = +i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x - x')$$

Die Matrixelemente des Kommutators sind dann

$$\begin{aligned} \langle x | [\hat{x}, \hat{p}] | x' \rangle &= \int dx'' \langle x | \hat{x} | x'' \rangle \langle x'' | \hat{p} | x' \rangle - \int dx'' \langle x | \hat{p} | x'' \rangle \langle x'' | \hat{x} | x' \rangle \\ &= \int dx'' x'' \delta(x - x'') \langle x'' | \hat{p} | x' \rangle - \int dx'' \langle x | \hat{p} | x'' \rangle x' \delta(x'' - x') \\ &= x \langle x | \hat{p} | x' \rangle - \langle x | \hat{p} | x' \rangle x' = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x') + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x') x' = +i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x') \end{aligned}$$

Insgesamt bekommen wir von den linken Termen

$$\langle x | \hat{H} | x' \rangle \equiv H_{xx'} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \delta(x - x')$$

Beispiel freie Dirac-Gleichung

Die Dirac-Gleichung in der Schrödingerform ist

$$\sum_{j=0}^3 \left(-i\hbar c \sum_{k=1}^3 \alpha_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k} + \gamma_{ij}^0 m c^2 \right) \Psi_j(x^1, x^2, x^3, t) - i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi_i(x^1, x^2, x^3, t) = 0$$

Dabei nummerieren k die α -Matrizen und i und j indizieren Spinor-Komponenten.

Auch diese Gleichung ist aufzufassen als Gleichung zwischen Matrixelementen und Vektor-komponenten, wobei Summationen bereits ausgeführt wurden. Um die Summationen wieder-zubekommen kann wie oben vorgegangen werden.

Wir haben wieder

$$E_{tt'} = +i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \delta(t - t')$$

und vom linken Term bekommen wir

$$H_{x^1 x^2 x^3 x'^1 x'^2 x'^3} = \sum_{j=0}^3 \left(-i\hbar c \sum_{k=1}^3 \alpha_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k} + \gamma_{ij}^0 m c^2 \right) \delta(x^1 - x'^1) \delta(x^2 - x'^2) \delta(x^3 - x'^3)$$

Für die Matrixelemente des Operators Λ müssen wir nun gegenüber (34) außerdem die Spin-ortransformation berücksichtigen. Für einen Lorentz-Boost in Richtung x^1 ergäbe sich zum Bei-spiel

$$\Lambda_{\beta ii'}(x^1, x^2, x^3, t, x'^1, x'^2, x'^3, t') = \delta(x'^1 - \gamma(x^1 + \beta t)) \delta(x'^2 - x^2) \delta(x'^3 - x^3) \delta(t' - \gamma(t + \beta x^1)) \left(e^{-\frac{i}{2}\eta\alpha^1} \right)_{ii'}$$

mit der Rapidität $\tanh \eta = \beta$ und der Matrix α^1 in der gebräuchlichen Darstellung

$$\alpha^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Angewendet auf die Komponenten $\Psi_i(x^1, x^2, x^3, t)$ eines Bispinors bewirkt die Matrix von Λ die Transformation von der Perspektive von A auf die Perspektive von B.

$$\Lambda : \Psi_A(x^1, x^2, x^3, t) \mapsto \Psi_B(x^1, x^2, x^3, t) = e^{-\frac{i}{2}\eta\alpha^1} \Psi_A(\gamma(x^1 + \beta t), x^2, x^3, \gamma(t + \beta x^1))$$

Auch hierbei wird sich im Allgemeinen die \mathcal{H} - \mathcal{E} Verschränkung eines Vektors beim Wechsel der Perspektive ändern.

Bei dieser Abbildung wird eine Menge der vierfachen¹³ Mächtigkeit von \mathbb{R}^4 auf sich selbst ab-gebildet. Aufgrund der Gleichmächtigkeit dieser Menge mit \mathbb{R} ist es möglich, die Hilbertraum-Vektoren mit einem einzigen reellen Index z zu nummerieren, so dass die Matrizen aller Trans-formationen als $\Lambda_{zz'}$ geschrieben werden können. Aus der speziellen Gestalt dieser Matrizen, die die möglichen Perspektivwechsel für Beobachter festlegen, ergibt sich die Struktur von Raum und Zeit in der Wahrnehmung.

¹³aufgrund der Spinorkomponenten